

Aves de Manizales y sus alrededores

Grallarias

hormigueros y tapaculos

Guía de campo
29 especies

- ✓ Fácil identificación
- ✓ Sugerencia de ubicación
- ✓ Código QR con el canto de cada ave

flock.eco



Fotos:
FABIO N. ARIAS

GLOSARIO

- **Taraceada:** Decorada
- **Bermeja:** Rojo intenso
- **Rémiges:** Plumas de las alas
- **Bridas:** Zona entre ojos y fosas nasales
- **Culmen:** Punto más alto
- **Garra de hallux:** Dedo dirigido hacia atrás

CLAVES

T	Tamaño	LC	Preocupación menor
P	Peso	NT	Casi amenazado
D	Distribución	VU	Vulnerable
C	Características	♂	Macho
CE	Casi endémico	♀	Hembra
E	Endémico	inm.	Inmaduro
	Ilustración		Fotografía de colaborador

Si quieres conocer más sobre el sonido de estas aves visita la página web www.xeno-canto.org o escaneando el código QR al lado de las especies.



FOTÓGRAFOS COLABORADORES

- 1. Dušan Brinkhuizen • 2. Jorge Chinchilla • 3. Zheng Yongsheng
- 4. Daniel Orozco • 5. Jose Daniel Avendaño
- 6. Rubén Arango • 7. Ramiro Ramírez • 8. Jhon Florez

BIBLIOGRAFÍA

Nombres comunes y características: Hilty, S. L. y Brown, W. L. (1986). A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, 836 pp. Harold F. Greeney, David Beadle (2018) Antpittas and Gnatcatchers, Helm Identification Guides.

Nombres en inglés: Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, C. D. Cadena, S. Claramunt, A. Jaramillo, J. F. Pacheco, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. Version 23. September 2019. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>

Categoría de amenaza: The IUCN Red List of Threatened Species 2016: Downloaded on September 2019.

Grabaciones: www.xeno-canto.org (Jerome Fischer, Oscar H. Marin-Gomez, Peter Boesman, Fabrice Schmitt, Ottavio Janni, Olaf Jahn, Doug Knapp, Hotel Tinamu, Jim Holmes, Ottavio Janni, Martin St-Michel, Oswaldo Cortes, David Geale, Todd Mark, David Monroy Rengifo, David Bradley, Ross Gallardy).

Proyecto patrocinado por:



www.elnidocondor.com



Termal del Ruiz
HOTEL



As de Guías SAS.
Agencia de Viajes y Eventos



Proyecto apoyado por:



flock.eco



© Fabio N. Arias
Ilustraciones: Paula Andrea Romero A. / www.arteyconservacion.com
Diseño: Melissa Zuluaga

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL
Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la debida autorización.

© Edición N° 1
Coleccionable N° 4. Octubre 2019
Impresión: Matiz Taller Editorial

ISBN: 978-958-48-7696-6



PRÓXIMA GUÍA: CARPINTEROS, LOROS Y TREPATRONCOS

- **Taraceada:** Decorada
- **Bridas:** Zona entre ojos y fosas nasales
- **Bermeja:** Rojo intenso
- **Culmen:** Punto más alto
- **Rémiges:** Plumas de las alas
- **Garra de hallux:** Dedo dirigido hacia atrás

CLAVES

T	Tamaño	LC	Preocupación menor
P	Peso	NT	Casi amenazado
D	Distribución	VU	Vulnerable
C	Características	♂	Macho
CE	Casi endémico	♀	Hembra
E	Endémico	inm.	Inmaduro
il	Ilustración	fc	Fotografía de colaborador

Si quieres conocer más sobre el sonido de estas aves visita la página web www.xeno-canto.org o escaneando el código QR al lado de las especies.

FOTÓGRAFOS COLABORADORES

- 1. Dušan Brinkhuizen
- 2. Jorge Chinchilla
- 3. Zheng Yongsheng
- 4. Daniel Orozco
- 5. Jose Daniel Avendaño
- 6. Rubén Arango
- 7. Ramiro Ramírez
- 8. Jhon Florez

BIBLIOGRAFÍA

Nombres comunes y características: Hilty, S. L. y Brown, W. L. (1986). A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, 836 pp. Harold F. Greeney, David Beadle (2018) Antpittas and Gnatcatchers, Helm Identification Guides.

Nombres en inglés: Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, C. D. Cadena, S. Claramunt, A. Jaramillo, J. F. Pacheco, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. Version 23. September 2019. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>

Categoría de amenaza: The IUCN Red List of Threatened Species 2016: Downloaded on September 2019.

Grabaciones: www.xeno-canto.org (Jerome Fischer, Oscar H. Marin-Gomez, Peter Boesman, Fabrice Schmitt, Ottavio Janni, Olaf Jahn, Doug Knapp, Hotel Tinamu, Jim Holmes, Ottavio Janni, Martin St-Michel, Oswaldo Cortes, David Geale, Todd Mark, David Monroy Rengifo, David Bradley, Ross Gallardy).

Proyecto patrocinado por:



Proyecto apoyado por:



flock.eco



ISBN: 978-958-48-7696-6

PRÓXIMA GUÍA: CARPINTEROS, LOROS Y TREPATRONCOS

© Fabio N. Arias

Ilustraciones: Paula Andrea Romero A. / www.arteyconservacion.com

Diseño: Melissa Zuluaga

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la debida autorización.

© Edición N° 1

Coleccionable N° 4. Octubre 2019

Impresión: Matiz Taller Editorial

Aves de Manizales y sus alrededores

Grallarias

hormigueros y tapaculos

Guía de campo
29 especies



- ✓ Fácil identificación
- ✓ Sugerencia de ubicación
- ✓ Código QR con el canto de cada ave

flock.eco



#4

Fotos:
FABIO N. ARIAS

LC

El Color de mis Pájaros / HACIENDA el Bosque

E

LC

E

C

Hormiguerito cabeciestriado

Drymophila striaticeps

Streak-headed Antbird
(Chapman, 1912)

T 15 cm P 13 g
D 1.700 - 3.000 msnm

C El macho es color negro por encima con estrias blancas en toda la cabeza. Rabadilla rufa, alas negras con plumas de vuelo marginadas de rufo, cola escalonada de color negruzco con puntas blancas. La hembra se diferencia del macho por estriado rufo-canela en la frente, partes inferiores teñidas de rufo.



Hormiguero de parker

Cercomacroides parkeri

Parker's Antbird
(G. R. Graves, 1997)

T 14 cm P 17 g
D 1.200 - 2.000 msnm

C El macho es negro por encima y gris por debajo, con franjas blancas delgadas en las alas, notorio parche blanco detrás de la nuca ocasionalmente notorio. La hembra tiene las partes superiores de color pardo oliváceo, con corona y anillo ocular gris; las partes inferiores desde el mentón a la región infracaudal son de color rufo ferruginoso.



Hormiguero yegua

Cercomacra nigricans

Jet Antbird
(P. L. Slater, 1958)

T 15 cm P 17 g
D < 1.500 msnm

C El macho es negro intenso con dos barras alares blancas bien marcadas, cola muy gradada con amplio ápice blanco; parche interestapular oculto blanco. La hembra es por encima pizarra, alas y cola similar al macho pero más opacas; garganta, pecho y partes inferiores pizarra.



LC

Hormiguero immaculado

Hafferia immaculata

Blue-lored Antbird
(Lafresnaye, 1845)

T 18 cm P 43 g
D 600 - 1.800 msnm

C Región ocular desnuda azul clara al frente, blanquecina detrás. El macho es negro intenso; doblez del ala blanco. La hembra es café chocolate casi uniforme; lados de la cabeza, alta garganta y cola negruzcos; blanco en el ala como en el macho.



Tapaculo ocelado

Acropternis orthonyx

Ocellated Tapaculo
(Lafresnaye, 1843)

T 21,5 cm P 90 g
D 2.200 - 3.200 msnm

C Inconfundible.

Tierras altas. Frente, lados de la cabeza y garganta rufo canela, rabadilla y supra e infracaudales castaño, resto del cuerpo y cobertores alares castaño a leonado densamente decorado con manchas blancas en forma de gotas delineadas en negro. Pico negro con culmen elevado y aplanado, garra del hálux muy larga y recta.



El Color de mis Pájaros / Hacer el Bosque
Ternales del Ruiz / Hacer el Bosque

Tapaculo cenizo

Myornis senilis

Ash-colored Tapaculo
(Lafresnaye, 1840)

- T 14 cm P 20 g
- D 2.300 - 3.500 msnm
- C Pico y patas negruzco. El macho es gris oscuro, ligeramente más pálido debajo, cola notoriamente larga y usualmente recta. La hembra es similar, pero plumas de espalda con márgenes parduscos.



Tapaculo negruzco

Scytalopus latrans

Blackish Tapaculo
(Hellmayr, 1924)

- T 11 cm P 20 g
- D 2.100 - 3.500 msnm
- C Presenta iris y patas café oscuro y pico negruzco. El macho es de color gris oscuro a gris negruzco. La hembra es de color gris oscuro uniforme o con lavado café oliva tenue en algunas plumas de los flancos.



Tapaculo ventrirrufo

Scytalopus atratus

White-crowned Tapaculo
(Hellmayr, 1922)

- T 12 cm P 25 g
- D 1.000 - 2.000 msnm
- C Presenta iris café oscuro, patas café negruzca y pico negruzco. Es principalmente de color negruzco, presenta parche blanco en la coronilla y rabadilla café rojiza. Sus partes inferiores son de color negro grisáceo, en ocasiones con un parche pálido contrastante en la garganta, tiene flancos y vientre café rojizos con barrado negro. Las plumas de su vientre presentan puntas blancas. La hembra es un poco más pálida que el macho, en ocasiones con tinte pardusco por encima, flancos más rufos, con parche de la coronilla más pequeño y opaco.



Tapaculo de Stiles

Scytalopus stilesi

Stiles's Tapaculo
(Cuervo et al., 2005)

- T 11 cm P 22 g
- D 1.400 - 2.200 msnm
- C Tiene el iris café oscuro, patas café grisácea y pico negro con la base de la mandíbula de color cuerno. Presenta partes superiores negruzcas, partes inferiores grises con la barbilla y la garganta más pálidas, bajo vientre, flancos y muslos café brillante con barrado gris oscuro. Su rabadilla es un tanto más oscura y menos barrada y su cola y alas de color negro. La hembra tiende a ser más pálida en el vientre y en muchos casos con plumas secundarias y cobertores alares café.



Tapaculo de Spillmann

Scytalopus spillmanni

Spillmann's Tapaculo
(Stresemann, 1937)

- T 12 cm P 25 g
- D 2.000 - 3.200 msnm
- C Tiene iris café oscuro, pico negruzco y patas café oscuras. El macho es de color gris negruzco por encima con la rabadilla y cobertores supracaudales café oscuras y los márgenes internos de las rémiges, baja espalda, cola y nuca lavados de café oscuro. Por debajo es de color gris, en ocasiones con las puntas de las plumas del vientre de color plata, bajo vientre rosáceo, flancos y cobertores infracaudales ocráceo leonado a café canela con barrado oscuro. La hembra presenta lavado café de partes superiores más extenso, bajo vientre naranja y barrado de flancos más claro.



Tapaculo opaco

Scytalopus opacus

Paramo Tapaculo
(J. T. Zimmer, 1941)

- T 11 cm P 15 g
- D 3.000 - 3.800 msnm
- C Tiene iris café, patas fúscas y pico negro. Presenta partes superiores e inferiores principalmente de color gris con flancos y vientre usualmente de color ocre leonado a café canela u oscuro con estrecho barrado oscuro.



Tororoi ondulado

Grallaria squamigera

Undulated Antpitta
(Lafresnaye, 1842)

T 23 cm P 130 g
D 1.700 - 2.300 msnm

Grande con pico notablemente robusto. Por encima café oliváceo fuertemente teñido de gris en coronilla, garganta blanca bordeada a los lados por bigotera negruzca, lados de cabeza y resto de partes inferiores amarillento, plumas marginadas de negro con apariencia de barrado ondulado más bien grueso.



Tororoi bigotudo

Grallaria alleni

Moustached Antpitta
(Chapman, 1912)

T 17 cm P 70 g
D 1.700 - 3.100 msnm

Muy raro y local. Encima rufo oscuro con coronilla y nuca gris pizarra, lados de la cabeza café oscuro, amplia bigotera blanca estrechamente escamada de negro, garganta bermeja bordeada por debajo por amplia banda pectoral blanca, pecho café oliva con unas pocas estrias blancas estrechas, abdomen blanco anteado.



Tororoi dorsiescamado

Grallaria guatemalensis

Scaled Antpitta
(Lafresnaye, 1842)

T 18 cm P 94 g
D 300 - 2.000 msnm

Nuca gris; coronilla y resto de partes superiores café oliva, plumas de todas las partes superiores escamadas negruzco, rémiges café uniforme, garganta café bordeada por los lados por bigoteras y por debajo por medialuna difusa, resto de partes inferiores leonado canela con algo de moteado negruzco en el pecho.



Tororoi comprapán

Grallaria ruficapilla

Chestnut-crowned Antpitta
(Lafresnaye, 1842)

T 20 cm P 85 g
D 1.200 - 2.800 msnm

Grande. Coronilla, nuca y lados de la cabeza rufo canela brillante en contraste con partes superiores oliva y garganta blanco, resto de partes inferiores blancas ampliamente estriadas y marginadas negruzco y oliva.



Tororoi rufocenizo

Grallaria rufocinerea

Bicolored Antpitta
(P. L. Sclater & Salvin, 1879)

T 16 cm P 45 g
D 2.100 - 3.100 msnm

Cabeza, garganta y partes superiores café rufo oscuro uniforme; pecho a vientre gris oscuro.



Tororoi chusquero

Grallaria nuchalis

Chestnut-naped Antpitta
(P. L. Sclater, 1874)

T 20 cm P 122 g
D 2.200 - 3.000 msnm

Grande. Nuca castaño brillante en contraste con partes superior café rufo más opaco, debajo gris pizarra uniforme, negruzco en la garganta y la área facial.



El Color de mis Pájaros / chec
el nido del condor / HACIENDA el bosque

CE

VU

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

chec

Tororoi flautista

Grallaria rufula

Rufous Antpitta
(Lafresnaye, 1843)

- T 14 cm P 40 g
- D 2.400 - 3.600 msnm
- C Pequeño. Enteramente castaño rufo uniforme, un poco más brillante en centro del vientre.




Tororoi leonado

Grallaria quitensis

Western Tawny Antpitta
(Lesson, 1844)

- T 18 cm P 60 g
- D 2.200 - 3.700 msnm
- C Por encima oliva pardusco opaco, lados de la cabeza y partes superiores ocráceo. Jóvenes con cantidad variable de barrado, principalmente en coronilla, nuca y pecho.



Tororoi de miller

Grallaria milleri

Brown-banded Antpitta
(Chapman, 1912)

- T 16,5 cm P 53 g
- D 2.700 - 3.100 msnm
- C Por encima café oscuro, bridas, garganta y centro del vientre blanco sucio, amplia banda pectoral café.



Tororoi enano

Grallaricula nana

Slate-crowned Antpitta
(Lafresnaye, 1842)

- T 11,5 cm P 23 g
- D 1.900 - 2.100 msnm
- C Coronilla y nuca gris pizarra, resto de partes superiores café con sombra oscuro, anillo ocular prominente de color ocráceo, partes inferiores rufo naranja intenso, más pálido en garganta, estrecha y difusa medialuna pectoral blanca.



Tororoi medialuna

Grallaricula lineifrons

Crescent-faced Antpitta
(Chapman, 1924)

- T 11 cm P 22 g
- D 3.000 - 3.200 msnm
- C Raro. Virtualmente sin cola. Coronilla y lados de la cabeza negro pizarra con amplia medialuna blanca frente a los ojos y parche canela en lados del cuello, resto de partes superiores oliva, garganta blanca bordeada a los lados por bigotera negra, pecho y lados ampliamente estriados canela y negro, abdomen blanco estriado de negro.



Tororoi cabecirrufo

Grallaricula cucullata

Hooded Antpitta
(P. L. Sclater, 1856)

- T 10 cm P 21 g
- D 1.500 - 2.700 msnm
- C Pico naranja. Toda la cabeza y garganta rufo naranja brillante, resto café oliva encima y gris debajo con estrecha medialuna blanca pectoral, centro de pecho y vientre blancos.



Batará mayor

Taraba major

Great Antshrike
(Vieillot, 1816)

T 19,5 cm P 70 g

D < 1.500 msnm

C Pico robusto y ganchudo. Ojos rojos.

Ligeramente crestado. El macho es negro por encima, partes inferiores blancas, cola negra estrechamente bordeada de blanco. La hembra es café rufo por encima y por debajo blanco puro teñido de pardusco en algunas zonas.



Batará carcajada

Thamnophilus multistriatus

Bar-crested Antshrike
(Lafresnaye, 1844)

T 16 cm P 23 g

D < 2.000 msnm

C El macho es barrado negro y blanco con la coronilla un poco más oscura. La hembra tiene rufo castaño por encima, los lados de la cabeza y la nuca. Las partes inferiores son barradas como el macho.



Batará occidental

Thamnophilus atrinucha

Black-crowned Antshrike
(Salvin and Godman, 1892)

T 15 cm P 24 g

D < 1.400 msnm

C Pico ganchudo y robusto. El macho es principalmente gris por encima con coronilla negra, espalda mezclada con negro, alas y cola negras con abundante punteado de blanco, cola con ápices blancos. Por debajo gris, más pálido que por encima. La hembra es café oliva por encima con coronilla castaña opaca; alas y cola café similares al macho, partes inferiores oliva pardusco claro; garganta, pecho y abdomen teñidos.



LC

Hormiguerito tizado

Dysithamnus mentalis

Plain Antvireoz
(Temminck, 1823)

T 12 cm P 16 g

D 400 - 2.300 msnm

C Pico robusto, cola corta. El macho es gris oliva oscuro por encima, más oscuro en coronilla y especialmente en mejillas, posee dos estrechas barras alares blancas, garganta y centro del vientre blanquecinos. La hembra tiene coronilla castaño, partes superiores oliva grisáceo, dos barras alares difusas, anillo ocular blanco y mejillas negruzcas, partes inferiores oliva grisáceo pálido, más blanco en garganta y abdomen.



LC

Hormiguero barbiescamado

Epinecrophylla fulviventris

Checker-throated Antwren
(Lauurence, 1862)

T 11 cm P 11,5 g

D < 1.000 msnm

C Iris pálido. El macho es por encima oliva pardusco, ligeramente más gris en lados de la cara, cobertores alares negruzcas con dos barras. Garganta taraceada negro y blanco, resto de partes inferiores café. La hembra es similar por encima, partes inferiores ocráceo opaco o con unas pocas estrías negruzcas en garganta.



LC

Hormiguerito pizarroso

Myrmotherula schisticolor

Slaty Antwren
(Lauurence, 1865)

T 9,5 cm P 10 g

D 1.200 - 2.400 msnm

C El macho es gris pizarra con garganta y pecho negro, cobertores alares negruzcas, dos barras alares punteadas de blanco, infracaudales moteadas con blanco. La hembra es muy opaca: oliva pardusco por encima, espalda más gris; cobertores alares uniformes; garganta pálida ocasionalmente con negro; resto de partes inferiores pardusco teñido de ocráceo en el pecho.



Registro poco común